

## Le calendrier vaccinal avril 2019

AGE	VACCINS	OBSERVATIONS	
VACCINATION DES FEMMES EN AGE DE PROCREATION	Mise à jour de la vaccination antitétanique	dT1	Dès le premier contact avec la structure de santé
		dT2	1 mois après dT1
		dT3	1 an après dT2
		dT4	5 ans après dT3
		dT5	Tous les 10 ans après dT4
Mère en post- partum immédiat	Vaccin de la rubéole	Pour les femmes non immunisées contre la rubéole	
VACCINATION DE L'ENFANT EN AGE PRESCOLAIRE	A la naissance	BCG	- Vaccin contre la tuberculose : 1 seule dose le plus tôt possible après la naissance. Ne sont plus indiquées dans la suite de cette 1 <sup>ère</sup> injection ni la pratique de l'IDR à la tuberculine ni le rappel par le BCG
		HBV-0	- Vaccin contre l'hépatite B : cette prise est à administrer durant les 24 heures qui suivent la naissance quel que soit le résultat de la sérologie de l'hépatite B chez la mère
	A 2 mois	Pentavalent-1 + VPI + PCV1	- 1 <sup>ère</sup> injection de vaccin Pentavalent qui inclut le vaccin de l'hépatite B, le DTC (vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche) et le vaccin Hib (contre l'haemophilus type b) - 1 <sup>ère</sup> prise du vaccin contre la poliomyélite (injectable) <b>- 1<sup>ère</sup> prise du vaccin pneumococcique</b>
	A 3 mois	Pentavalent-2 + VPI	- 2 <sup>ème</sup> prise du vaccin pentavalent - 2 <sup>ème</sup> prise du vaccin contre la poliomyélite (injectable)
	A 4 mois	PCV2	<b>- 2<sup>ème</sup> prise du vaccin pneumococcique</b>
	A 6 mois	Pentavalent-3 + VPO	- 3 <sup>ème</sup> prise du vaccin pentavalent - 3 <sup>ème</sup> prise du vaccin contre la poliomyélite (oral)
	A 11 mois	PCV3	<b>3<sup>ème</sup> prise du vaccin pneumococcique</b>
	A 12 mois	RR-1	1 <sup>ère</sup> prise du vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole
	A 18 mois	DTC4 + VPO + RR-2	- Rappel par les vaccins DTC - Rappel par le vaccin contre la poliomyélite (oral) - Rappel par le vaccin contre la rougeole et la rubéole
VACCINATION DE L'ENFANT EN AGE SCOLAIRE	A 6 ans (élèves en 1 <sup>ère</sup> année de l'école de base)	VPO + VHA	- Rappel par le vaccin oral contre la poliomyélite - Une prise du vaccin de l'hépatite virale A
	A 7 ans (élèves en 2 <sup>ème</sup> année de l'école de base)	dT	- Rappel par les vaccins contre la diphtérie et le tétanos
	A 12 ans (élèves en 6 <sup>ème</sup> année de l'école de base)	dT + VPO	- Rappel par les vaccins contre la diphtérie et le tétanos - Rappel par le vaccin oral contre la poliomyélite
	A 18 ans (élèves en 3 <sup>ème</sup> année secondaire)	dT + VPO	- Rappel par les vaccins contre la diphtérie et le tétanos - Rappel par le vaccin oral contre la poliomyélite